

Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS Lucille-Teasdale, 2005

Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1

Indicateurs	Population estimée	Mesure %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
Habitudes de vie						
Fumeurs	46 100	31	[25,2 ; 35,9]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	59 400	42	[36,0 ; 48,0]			
Faible fréquence de l'activité physique	41 100	27	[22,1 ; 32,5]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	30 800	20	[15,5 ; 25,0]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	14 800	10 *	[6,4 ; 13,6]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	28 200	19	[14,4 ; 23,9]			
Environnements social et physique						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	81 200	54	[47,7 ; 59,5]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	12 600	12 *	[7,9 ; 17,5]			
État de santé générale						
Perception négative de l'état de santé	21 800	14	[10,5 ; 19,0]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	28 200	19	[14,3 ; 23,6]			
Incapacité d'une journée ou plus au cours des 2 dernières semaines	17 300	12	[8,1 ; 15,8]			
État de santé physique						
Allergies alimentaires	9 500	6 *	[3,8 ; 9,8]			
Allergies autres qu'alimentaires	43 800	29	[23,6 ; 34,1]			
Asthme	14 600	10 *	[6,4 ; 13,5]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	19 600	29	[21,4 ; 37,9]			
Maux de dos (autres que fibromyalgie/arthrite)	31 100	20	[15,8 ; 25,2]			
Migraines	13 800	9 *	[6,1 ; 13,1]			
Hypertension - 45 ans et plus	21 600	32	[23,6 ; 39,9]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	32 800	23	[18,2 ; 28,5]			
Obésité (IMC ≥ 30) - 18 ans et plus	23 300	16	[12,1 ; 21,5]			
Blessures (dernière année)	15 000	10 *	[6,6 ; 14,0]			
État de santé mentale						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	22 300	15	[11,2 ; 20,3]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	42 900	31	[25,6 ; 36,9]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	39 600	42	[34,9 ; 49,8]			
Services préventifs						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	18 000	54	[41,7 ; 66,3]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	44 600	71	[61,5 ; 78,8]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	20 300	40	[29,8 ; 49,4]			
Services de première ligne						
Avoir un médecin de famille	97 500	65	[59,0 ; 70,1]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	96 600	64	[58,3 ; 69,4]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	53 100	35	[29,5 ; 40,6]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	10 700	7 *	[4,3 ; 10,6]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	21 100	14	[10,2 ; 18,6]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	19 500	13	[9,3 ; 17,4]			

* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source :

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

Légende : CSSS vs Montréal

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible